



INDICAZIONI PER I REPARTI

che devono essere fornite al paziente per la preparazione all'esame di scintigrafia miocardica

Comunicare ed accertarsi che il paziente:

- sia a digiuno da almeno 4 ore;
- sia emodinamicamente e clinicamente stabile;
- sospenda per almeno 24 ore l'assunzione di:
 - ✓ thè
 - ✓ caffè
 - ✓ cioccolata
 - ✓ coca cola (o sostanze contenenti xantine);
- per gli uomini: torace depilato;
- per donne in età fertile: test di gravidanza;
- **su indicazione cardiologica** sospenda, se in corso, terapia cardio-attiva di:
 - ✓ nitroderivati da 24 h;
 - ✓ beta-bloccante a breve durata, calcio antagonista, teofillina da 48 h;
 - ✓ betabloccanti a lunga durata da 4 giorni;

Specificare in cartella clinica: il giorno e l'orario di sospensione della terapia farmacologica cardio-attiva.

Comunicare, al momento della programmazione, eventuali controindicazioni ad assumere pasto grasso colecistocinetico (generalmente indicato dopo la somministrazione del radiofarmaco per limitare l'attività sottodiaframmatica e ottimizzare la qualità delle immagini scintigrafiche): ad es: reflusso duodeno-gastrico, severa ernia iatale, altre patologie gastro-duodenali.

Per eventuali dubbi o chiarimenti:

Servizio Medicina Nucleare Osp.S.Orsola tel 051/2143174 oppure 3967