

**AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA**  
**RESPONSABILE: DOTT. M.P. DI SIMONE**  
**N. TEL. 051/6363359**  
**Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna**  
**Pad. 25-27-28**

**Signor / a** \_\_\_\_\_

**Posizionata PEG tipo** \_\_\_\_\_ **il giorno** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / **200**\_\_

### **MEDICAZIONE DELLA STOMIA**

- Effettuare a giorni alterni
- Detergere accuratamente la cute attorno all'ingresso della sonda e nei punti di ancoraggio con amuchina
- Pulire accuratamente anche sotto la placca cutanea ed asciugare con cura
- Tra la placca di bloccaggio e la cute, versare alcune gocce di mercurio cromo

### **MODALITA' DI INFUSIONE**

- La nutrizione può essere effettuata tramite siringa in 3-4 somministrazioni da distribuire nell'arco della giornata, oppure tramite nutripompa (1 cc = 1 ml, ml/ora = velocità di somministrazione. Es. velocità consigliata per 2000 ml/die: 150 ml/ora)
- Per il tipo di dieta da seguire è necessario fare riferimento ad un nutrizionista
- E' opportuno effettuare la nutrizione da seduti oppure a letto con il tronco sollevato di 30° per evitare il reflusso del nutriente in esofago

### **MANUTENZIONE DELLA SONDA**

- Effettuare il lavaggio della sonda con acqua tiepida all'inizio ed al termine di ogni infusione se l'infusione è intermittente, oppure ogni 4-5 ore se l'infusione è continua.
- Il lavaggio va effettuato con forza ed in modo da lasciare la sonda ripiena di acqua
- In caso di blocco della sonda effettuare lavaggio con olio o con sostanza gassata

**IN CASO DI NECESSITA' CONTATTARE L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA**