

Prova 2		
1	Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco: a. Con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito. b. Con il polso esteso ed il palmo verso l'alto. c. Con il polso flesso e la mano chiusa. d. Con il polso esteso ed il palmo verso il basso.	2,000
2	I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è: a. Il lavaggio antisettico.	

	b. Possono essere utilizzati ugualmente contenitori sterili o contenitori non sterili. c. L'uso di contenitori sterili. d. Prima della raccolta bisogna somministrare al paziente clistere evacuante.									
10	La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo. Individuare tra quelle indicate la sequenza corretta: a. Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione. b. Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione. c. Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione – selezione. d. Raccolta – decontaminazione – pulizia –risciacquo – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione.	1,500								
11	Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione seduta o supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare – con una mano – il padiglione auricolare: a. Verso l'alto e in avanti. b. Verso l'alto e indietro. c. Verso il basso e in avanti. d. Verso il basso e indietro.	0,500								
12	Il rifacimento del letto deve essere eseguito: a. Solo una volta al giorno. b. Quando la persona lo richiede e quando l'operatore lo ritiene necessario. c. Al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria. d. Quotidianamente e secondo i bisogni della persona.	1,000								
13	La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente considerato, di circa: a. Del 40%. b. Del 60%. c. Dell'80%. d. Dipende da troppi fattori perciò non è possibile valutarlo	1,500								
14	In che cosa consiste la dislessia? a. Nell'incapacità di imparare a scrivere. b. Nell'incapacità di apprendere il disegno. c. Nell'incapacità di apprendere il linguaggio. d. Nell'incapacità di imparare a leggere.	1,500								
15	Di seguito sono riportate alcune affermazioni sulle regole per assicurare la corretta raccolta di materiali biologici. Quale sequenza di Vero (V) / Falso (F) tra le seguenti è corretta? - Le mani degli Operatori sanitari rappresentano il veicolo principale di trasferimento di microrganismi patogeni da un Paziente all'altro, e dai Pazienti a sé stessi - Scopo del lavaggio antisettico è rimuovere completamente la popolazione microbica transitoria e parte di quella residente - Non lavarsi le mani prima di procedere ad interventi a rischio sul Paziente può essere causa di infezioni esogene - È opportuno che i contenitori degli erogatori di sapone che devono essere periodicamente rabboccati abbiano una capacità superiore a 900 ml, per evitare riempimenti frequenti a. V, V, V, F. b. F, V, V, F. c. V, V, F, F. d. V, V, V, V.	1,500								
16	La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti comporta il rispetto di linee guida di riferimento e di procedure definite ed adottate da ogni singola struttura al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Associate ciascuna tipologia di rifiuto alla relativa modalità di raccolta (combinazione lettera-numero): <table><tr><td>A) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.</td><td>1) Contenitore rigido riutilizzabile.</td></tr><tr><td>B) Rifiuti sanitari non pericolosi.</td><td>2) Contenitori in plastica.</td></tr><tr><td>C) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.</td><td>3) Taniche e contenitori in materia plastica non riutilizzabili dotati di imboccatura larga, accessori di riempimento a chiusura ermetica.</td></tr><tr><td>D) Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.</td><td>4) Sacco interno più contenitore rigido esterno.</td></tr></table> a. A-3; B-2; C-1; D-4. b. A-2; B-1; C-4; D-3. c. A-4; B-2; C-3; D-1. d. A-1; B-4; C-3; D-2.	A) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.	1) Contenitore rigido riutilizzabile.	B) Rifiuti sanitari non pericolosi.	2) Contenitori in plastica.	C) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.	3) Taniche e contenitori in materia plastica non riutilizzabili dotati di imboccatura larga, accessori di riempimento a chiusura ermetica.	D) Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.	4) Sacco interno più contenitore rigido esterno.	1,500
A) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.	1) Contenitore rigido riutilizzabile.									
B) Rifiuti sanitari non pericolosi.	2) Contenitori in plastica.									
C) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.	3) Taniche e contenitori in materia plastica non riutilizzabili dotati di imboccatura larga, accessori di riempimento a chiusura ermetica.									
D) Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.	4) Sacco interno più contenitore rigido esterno.									
17	Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive? a. Frutti di mare, acqua inquinata. b. Da malato a sano, da portatore a sano. c. Per inquinamento atmosferico. d. Inalatoria, oro-fecale, parenterale.	0,500								
18	Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario? a. Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma. b. Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma. c. Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra.	1,000								

	d. Sopracamicie protettivo, mascherina, guanti in vinile	
19	I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto: a. Rigonfiamento dell'area della lesione. b. Tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione. c. Diminuzione della frequenza cardiaca. d. Segni di contusione, non accompagnati da continuità della cute.	2,000
20	Per materiale riutilizzabile si intende (indicare l'affermazione giusta): a. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a rischio normale. b. Materiale, anche monouso, che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione. c. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. d. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. Se monouso, può essere risterilizzato solo una volta.	1,000
21	Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per: a. Prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario. b. Prevenire l'edema del glande. c. Assicurare la regolarità della minzione. d. Non importa riportarlo nella posizione iniziale.	1,000
22	Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena sono tutti i seguenti tranne uno: a. Sangue. b. Sperma. c. Lacrime. d. Secrezione vaginale.	0,500
23	Qual è la sede più utilizzata per il rilievo della temperatura corporea con termometri elettronici? a. Orale. b. Auricolare. c. Ascellare. d. Nasale.	0,500
24	La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: a. Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza. b. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall'interno verso l'esterno della stanza. c. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti indifferentemente dall'interno o dall'esterno della stanza. d. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall'interno verso l'esterno della stanza.	1,000
25	Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo: a. Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno. b. Dalla palpebra superiore a quella inferiore. c. Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno. d. Dalla palpebra inferiore a quella superiore.	1,000