



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

PROVA PRATICA C

TIPO TEST: 1
*(contrassegnare nel foglio
risposte con una crocetta il
numero 1 del TIPO TEST)*

Handwritten signatures and initials: a large stylized signature at the top, and three smaller signatures/initials (Jb, 83, and a cursive mark) below it.



PROVA PRATICA C – TIPO TEST 1

1. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

2. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

3. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

4. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria è un incentivatore di flusso?

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep

5. Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticità del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilità del SNC

6. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?

- A Ipertonia
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**

7. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento

m

Dr

pp
u



8. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?

A Il rinforzo del diaframma

B Il rinforzo dei muscoli intercostali

C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore

D Il rinforzo dei muscoli pettorali

9. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?

A Hermann Kabat

B Carlo Perfetti

C Signe Brunnstrom

D Berta Bobath

10. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :

A 8 mesi

B 10 mesi

C 12 mesi

D 17 mesi

60
Hb. Ms



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

PROVA PRATICA C

TIPO TEST: 2

*(contrassegnare nel foglio
risposte con una crocetta il
numero 2 del TIPO TEST)*

Dr
S
M
M

PROVA PRATICA C – TIPO TEST 2



1. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?

- A Ipertonia
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**

2. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento

3. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?

- A Il rinforzo del diaframma**
- B Il rinforzo dei muscoli intercostali
- C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore
- D Il rinforzo dei muscoli pettorali

4. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?

- A Hermann Kabat
- B Carlo Perfetti
- C Signe Brunnstrom
- D Berta Bobath**

5. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :

- A 8 mesi
- B 10 mesi
- C 12 mesi
- D 17 mesi**



6. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

7. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

8. Qual è l'articolari  consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

9. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria   un incentivatore di flusso?

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep

10. Quale fra le seguenti non   una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticit  del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilit  del SNC



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

PROVA PRATICA* **C*

TIPO TEST: 3

*(contrassegnare nel foglio
risposte con una crocetta il
numero 3 del TIPO TEST)*

S
M
B
M



PROVA PRATICA C – TIPO TEST 3

1. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

2. Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticità del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilità del SNC

3. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

4. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?

- A Ipertonia
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**

5. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :

- A 8 mesi
- B 10 mesi
- C 12 mesi
- D 17 mesi**

6. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento



7. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

8. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?

- A Il rinforzo del diaframma**
- B Il rinforzo dei muscoli intercostali
- C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore
- D Il rinforzo dei muscoli pettorali

9. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?

- A Hermann Kabat
- B Carlo Perfetti
- C Signe Brunnstrom
- D Berta Bobath**

10. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria è un incentivatore di flusso?

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep