

| quesito n. | |
|------------|---|
| 1. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 52 anni, sottoposta a quadrantectomia SE della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 30 mm</p> <p>pN0(sn) (0/2)</p> <p>RE 90%</p> <p>RP 5%</p> <p>HER2 2+</p> <p>Ki67 19%</p> <p>Recurrence Score 24</p> |
| 2. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 67 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QSI della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 18 mm operabile conservativamente</p> <p>cN0</p> <p>RE 0%</p> <p>RP 100%</p> <p>HER2 3+</p> <p>Ki67 24%</p> |
| 3. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 48 anni, sottoposta a quadrantectomia SE della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 30 mm</p> <p>pN0(sn) (0/2)</p> <p>RE 90%</p> <p>RP 5%</p> <p>HER2 2+</p> <p>Ki67 19%</p> <p>Recurrence Score 24</p> |
| 4. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 48 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QSE della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 16 mm operabile conservativamente</p> <p>cN0</p> <p>RE 0%</p> <p>RP 60%</p> <p>HER2 3+</p> <p>Ki67 25%</p> |
| 5. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 59 anni, sottoposta a mastectomia sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 19 mm</p> <p>pN0(sn) (0/1)</p> <p>RE 80%</p> <p>RP 80%</p> <p>HER2 0</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>Ki67 35%</p> <p>Recurrence Score 22</p> |
| 6. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 28 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QSE della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 13 mm, operabile conservativamente</p> <p>cNO</p> <p>RE 100%</p> <p>RP 100%</p> <p>HER2 3+</p> <p>Ki67 25%</p> |
| 7. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 44 anni, sottoposta a mastectomia sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 19 mm</p> <p>pNO(sn) (0/1)</p> <p>RE 80%</p> <p>RP 80%</p> <p>HER2 0</p> <p>Ki67 35%</p> <p>Recurrence Score 22</p> |
| 8. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 72 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QIE della mammella sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 13 mm, operabile conservativamente</p> <p>cNO</p> <p>RE 80%</p> <p>RP 40%</p> <p>HER2 3+</p> <p>Ki67 20%</p> |
| 9. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 39 anni, sottoposta a quadrantectomia infero-interna della mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 12 mm</p> <p>pNO(sn) (0/1)</p> <p>RE 90%</p> <p>RP 0%</p> <p>HER2 1+</p> <p>Ki67 29%</p> <p>Recurrence Score 21</p> |
| 10. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 35 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QIE della mammella sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 13 mm, operabile conservativamente</p> <p>cNO</p> <p>RE 40%</p> <p>RP 40%</p> |

| | |
|------------|---|
| | HER2 2+ Ki67 29% |
| 11. | Contesto: prima visita ambulatoriale Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche Femmina, 69 anni, sottoposta a quadrantectomia infero-interna della mammella destra Carcinoma duttale infiltrante G3 di 12 mm pN0(sn) (0/1) RE 90% RP 80% HER2 1+ Ki67 23% Recurrence Score 26 |
| 12. | Contesto: prima visita ambulatoriale Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche Femmina, 65 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QIE della mammella sinistra Carcinoma duttale infiltrante G3 di 9 mm, operabile conservativamente cN0 RE 0% RP 0% HER2 3+ Ki67 34% |
| 13. | Contesto: prima visita ambulatoriale Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche Femmina, 72 anni, sottoposta a quadrantectomia supero-centrale della mammella destra Carcinoma duttale infiltrante G3 di 18 mm pN0(sn) (0/3) RE 90% RP 0% HER2 1+ Ki67 28% Recurrence Score 24 |
| 14. | Contesto: prima visita ambulatoriale Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche Femmina, 70 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QII della mammella sinistra Carcinoma duttale infiltrante G2 di 12 mm, operabile conservativamente cN0 RE 0% RP 0% HER2 3+ Ki67 26% |
| 15. | Contesto: prima visita ambulatoriale Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche Femmina, 46 anni, sottoposta a quadrantectomia supero-esterna della mammella destra Carcinoma duttale infiltrante G3 di 18 mm pN0(sn) (0/3) RE 90% RP 0% |

| | |
|-----|--|
| | <p>HER2 1+</p> <p>Ki67 28%</p> <p>Recurrence Score 24</p> |
| 16. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 50 anni, ha eseguito biopsia per nodulo del QII della mammella sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G3 di 11 mm, operabile conservativamente</p> <p>cNO</p> <p>RE 0%</p> <p>RP 0%</p> <p>HER2 3+</p> <p>Ki67 28%</p> |
| 17. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 46 anni, sottoposta a mastectomia sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 38 mm</p> <p>pNO(sn) (0/2)</p> <p>RE 90%</p> <p>RP 10%</p> <p>HER2 2+</p> <p>Ki67 25%</p> <p>Recurrence Score 24</p> |
| 18. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 42 anni, ha eseguito biopsia per nodulo retroareolare mammella destra, nel contesto di microcalcificazioni diffuse</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 25 mm</p> <p>cNO</p> <p>RE 85%</p> <p>RP 1%</p> <p>HER2 2+</p> <p>Ki67 18%</p> |
| 19. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 56 anni, sottoposta a mastectomia sinistra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 38 mm</p> <p>pNO(sn) (0/2)</p> <p>RE 90%</p> <p>RP 10%</p> <p>HER2 2+</p> <p>Ki67 25%</p> <p>Recurrence Score 24</p> |
| 20. | <p>Contesto: prima visita ambulatoriale</p> <p>Descriva le indicazioni diagnostico-terapeutiche derivanti dall'esame istologico di seguito riportato considerando le possibili variabili cliniche</p> <p>Femmina, 63 anni, ha eseguito biopsia per nodulo QSE mammella destra</p> <p>Carcinoma duttale infiltrante G2 di 21 mm (taglia seno 4[^])</p> <p>cNO</p> |

| | |
|--|---|
| | RE 90% RP 90% HER2 2+ Ki67 28% |
|--|---|