



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 1



- 1) Procedura: Igiene e cura della Tracheostomia. Indicare la corretta sequenza delle azioni
 - spiegare la procedura al paziente (1)
 - dopo la cura della stomia passare alla pulizia della controcannula (2)
 - predisporre il campo sterile con il materiale necessario all'esecuzione della procedura (3)
 - sistemare il paziente in posizione semiFowler ed il letto ad altezza adeguata comodo per l'operatore (4)

A 4-3-2-1
B 1-4-3-2
C 3-2-4-1
- 2) I pazienti con gruppo sanguigno AB RH+ sono
 - A donatori universali
 - B riceventi universali
 - C non possono donare
- 3) In base alle linee guida sulla corretta igiene delle mani, le stesse vanno lavate
 - A prima e dopo ogni manovra sul paziente
 - B dopo il contatto con oggetti contaminati
 - C entrambe le precedenti
- 4) La scala di Barthel
 - A accerta le attività di base della persona e quindi la sua autosufficienza
 - B valuta il dolore nel paziente con deficit cognitivi
 - C valuta il rischio di cadute nell'anziano
- 5) Cosa occorre raccomandare al paziente diabetico per ciò che riguarda la corretta conservazione dell'insulina
 - A i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati fino al loro esaurimento
 - B i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati entro 28 giorni dall'apertura
 - C i flaconcini di insulina aperti / penne in uso devono essere conservati in frigorifero



- 6) Quando si somministra una nutrizione enterale mediante Sondino Naso Gastrico, l'eccessiva velocità o elevati volumi possono provocare
- A distensione e dolori addominali
 - B stipsi
 - C polmonite da aspirazione
- 7) Quale, tra gli strumenti elencati, è da considerarsi un sistema di somministrazione dell'ossigeno terapia a basso flusso
- A maschera di Venturi
 - B occhialini nasali
 - C maschera con reservoir
- 8) Il colore francamente ambrato delle urine è un segno di
- A infezione delle vie urinarie con presenza di pus
 - B presenza di globuli rossi o contaminazione da flusso mestruale
 - C presenza elevata di bilirubina
- 9) In relazione alla raccolta di campioni di espettorato, quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
- A eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione
 - B invitare l'assistito a raccogliere il campione lontano dai pasti
 - C includere nel campione materiale salivare
- 10) Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere
- A rincappucciati o piegati
 - B smaltiti nei contenitori per rifiuti taglienti
 - C smaltiti nei rifiuti ordinari



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 2



- 1) Cosa occorre raccomandare al paziente diabetico per ciò che riguarda la corretta conservazione dell'insulina
 - A i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati fino al loro esaurimento
 - B i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati entro 28 giorni dall'apertura
 - C i flaconcini di insulina aperti / penne in uso devono essere conservati in frigorifero

- 2) In base alle linee guida sulla corretta igiene delle mani, le stesse vanno lavate
 - A prima e dopo ogni manovra sul paziente
 - B dopo il contatto con oggetti contaminati
 - C entrambe le precedenti

- 3) Il colore francamente ambrato delle urine è un segno di
 - A infezione delle vie urinarie con presenza di pus
 - B presenza di globuli rossi o contaminazione da flusso mestruale
 - C presenza elevata di bilirubina

- 4) Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere
 - A rincappucciati o piegati
 - B smaltiti nei contenitori per rifiuti taglienti
 - C smaltiti nei rifiuti ordinari

- 5) La scala di Barthel
 - A accerta le attività di base della persona e quindi la sua autosufficienza
 - B valuta il dolore nel paziente con deficit cognitivi
 - C valuta il rischio di cadute nell'anziano

- 6) Quale, tra gli strumenti elencati, è da considerarsi un sistema di somministrazione dell'ossigeno terapia a basso flusso
 - A maschera di Venturi
 - B occhialini nasali
 - C maschera con reservoir



- 7) In relazione alla raccolta di campioni di espettorato, quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
- A eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione
 - B invitare l'assistito a raccogliere il campione lontano dai pasti
 - C includere nel campione materiale salivare
- 8) I pazienti con gruppo sanguigno AB RH+ sono
- A donatori universali
 - B riceventi universali
 - C non possono donare
- 9) Procedura: Igiene e cura della Tracheostomia. Indicare la corretta sequenza delle azioni
- spiegare la procedura al paziente (1)
 - dopo la cura della stomia passare alla pulizia della controcanula (2)
 - predisporre il campo sterile con il materiale necessario all'esecuzione della procedura (3)
 - sistemare il paziente in posizione semiFowler ed il letto ad altezza adeguata comodo per l'operatore (4)
- A 4-3-2-1
 - B 1-4-3-2
 - C 3-2-4-1
- 10) Quando si somministra una nutrizione enterale mediante Sondino Naso Gastrico, l'eccessiva velocità o elevati volumi possono provocare
- A distensione e dolori addominali
 - B stipsi
 - C polmonite da aspirazione



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3



- 1) In relazione alla raccolta di campioni di espettorato, quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
A eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione
B invitare l'assistito a raccogliere il campione lontano dai pasti
C includere nel campione materiale salivare

- 2) La scala di Barthel
A accerta le attività di base della persona e quindi la sua autosufficienza
B valuta il dolore nel paziente con deficit cognitivi
C valuta il rischio di cadute nell'anziano

- 3) In base alle linee guida sulla corretta igiene delle mani, le stesse vanno lavate
A prima e dopo ogni manovra sul paziente
B dopo il contatto con oggetti contaminati
C entrambe le precedenti

- 4) Procedura: Igiene e cura della Tracheostomia. Indicare la corretta sequenza delle azioni
- spiegare la procedura al paziente (1)
- dopo la cura della stomia passare alla pulizia della controcannula (2)
- predisporre il campo sterile con il materiale necessario all'esecuzione della procedura (3)
- sistemare il paziente in posizione semiFowler ed il letto ad altezza adeguata comodo per l'operatore (4)
A 4-3-2-1
B 1-4-3-2
C 3-2-4-1

- 5) Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere
A rincappucciati o piegati
B smaltiti nei contenitori per rifiuti taglienti
C smaltiti nei rifiuti ordinari

- 6) Quale, tra gli strumenti elencati, è da considerarsi un sistema di somministrazione dell'ossigeno terapia a basso flusso
A maschera di Venturi
B occhialini nasali
C maschera con reservoir



- 7) Cosa occorre raccomandare al paziente diabetico per ciò che riguarda la corretta conservazione dell'insulina
- A i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati fino al loro esaurimento
 - B i flaconcini di insulina aperti / penne in uso per cui è previsto un rapido consumo possono essere conservati a temperatura ambiente ed utilizzati entro 28 giorni dall'apertura
 - C i flaconcini di insulina aperti / penne in uso devono essere conservati in frigorifero
- 8) Il colore francamente ambrato delle urine è un segno di
- A infezione delle vie urinarie con presenza di pus
 - B presenza di globuli rossi o contaminazione da flusso mestruale
 - C presenza elevata di bilirubina
- 9) I pazienti con gruppo sanguigno AB RH+ sono
- A donatori universali
 - B riceventi universali
 - C non possono donare
- 10) Quando si somministra una nutrizione enterale mediante Sondino Naso Gastrico, l'eccessiva velocità o elevati volumi possono provocare
- A distensione e dolori addominali
 - B stipsi
 - C polmonite da aspirazione



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 1



- 1) Procedura: Posizionamento del sondino naso gastrico. Indicare la corretta sequenza della azioni
 - posizionare sul torace del paziente una traversa (1)
 - verificare la prescrizione medica sulla documentazione clinica (2)
 - proseguire nell'introduzione dirigendo il sondino posteriormente fino a raggiungere l'orofaringe (3)
 - valutare la lunghezza del sondino da inserire (4)

A 4-2-1-3

B 1-2-4-3

C 2-1-4-3

- 2) Quale fra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia permette di erogare ossigeno a una percentuale definita
 - A cannula nasale
 - B sonda nasale
 - C maschera di Venturi

- 3) Le seguenti sono tutte raccomandazioni per la prevenzione delle ulcere da pressione **TRANNE**
 - A utilizzare presidi in gomma che ampliano la zona di compressione
 - B mantenere una buona idratazione del paziente
 - C ispezionare ogni giorno la cute di tutto il corpo

- 4) La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito: il Ministero della Salute raccomanda di
 - A effettuare sempre una radiografia intraoperatoria con relativa lettura prima dell'uscita del paziente dalla sala operatoria
 - B effettuare sempre la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente
 - C utilizzare garze radio opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento

- 5) La scala di Charriere definisce
 - A il materiale di cui è fatto il catetere vescicale
 - B il calibro del catetere vescicale
 - C il numero delle vie di un catetere vescicale

- 6) Quale è lo scopo di un drenaggio evacuativo
 - A favorire la risalita dei fluidi biologici
 - B svuotare all'esterno le raccolte liquide
 - C evitare la formazione di raccolte di pus



- 7) Quali sono i segni ed i sintomi locali dell'infezione del sito chirurgico
- A dolore irradiato al perimetro della sutura, versamento ematico e trombosi
 - B disidratazione, sudorazione algida e ipotensione
 - C calore, rossore, dolore e tumefazione
- 8) In una paziente ricoverata con diagnosi di Gravidanza extrauterina occorre
- A prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelenburg
 - B monitorare i parametri vitali per rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico
 - C mantenere una rigorosa dieta iposodica
- 9) Nell'ittero grave da Malattia Emolitica nel neonato, quale valore ematochimico è necessario monitorare
- A la Bilirubina
 - B le transaminasi
 - C la glicemia
- 10) In relazione all'emogasanalisi arteriosa quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
- A il sangue può essere prelevato dall'arteria femorale
 - B effettuare antisepsi della sede di inserzione dell'ago per un'area di almeno 10 cm partendo dall'esterno verso l'interno
 - C una delle complicanze è lo stravaso ematico



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 2



- 1) Quale è lo scopo di un drenaggio evaquativo
 - A favorire la risalita dei fluidi biologici
 - B svuotare all'esterno le raccolte liquide
 - C evitare la formazione di raccolte di pus

- 2) Le seguenti sono tutte raccomandazioni per la prevenzione delle ulcere da pressione **TRANNE**
 - A utilizzare presidi in gomma che ampliano la zona di compressione
 - B mantenere una buona idratazione del paziente
 - C ispezionare ogni giorno la cute di tutto il corpo

- 3) Quali sono i segni ed i sintomi locali dell'infezione del sito chirurgico
 - A dolore irradiato al perimetro della sutura, versamento ematico e trombosi
 - B disidratazione, sudorazione algida e ipotensione
 - C calore, rossore dolore e tumefazione

- 4) Nell'ittero grave da Malattia Emolitica nel neonato, quale valore ematochimico è necessario monitorare
 - A la bilirubina
 - B le transaminasi
 - C la glicemia

- 5) In una paziente ricoverata con diagnosi di Gravidanza extrauterina occorre
 - A prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelenburg
 - B monitorare i parametri vitali per rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico
 - C mantenere una rigorosa dieta iposodica

- 6) La scala di Charriere definisce
 - A il materiale di cui è fatto il catetere vescicale
 - B il calibro del catetere vescicale
 - C il numero delle vie di un catetere vescicale

- 7) In relazione all'emogasanalisi arteriosa quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
 - A il sangue può essere prelevato dall'arteria femorale
 - B effettuare antisepsi della sede di inserzione dell'ago per un'area di almeno 10 cm partendo dall'esterno verso l'interno
 - C una delle complicanze è lo stravasamento ematico



- 8) La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito: il Ministero della Salute raccomanda di
- A effettuare sempre una radiografia intraoperatoria con relativa lettura prima dell'uscita del paziente dalla sala operatoria
 - B **effettuare sempre la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente**
 - C utilizzare garze radio opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento
- 9) Procedura: Posizionamento del sondino naso gastrico. Indicare la corretta sequenza della azioni
- posizionare sul torace del paziente una traversa (1)
 - verificare la prescrizione medica sulla documentazione clinica (2)
 - proseguire nell'introduzione dirigendo il sondino posteriormente fino a raggiungere l'orofaringe (3)
 - valutare la lunghezza del sondino da inserire (4)
- A 4-2-1-3
 - B 1-2-4-3
 - C **2-1-4-3**
- 10) Quale fra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia permette di erogare ossigeno a una percentuale definita
- A cannula nasale
 - B sonda nasale
 - C **maschera di Venturi**



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI
FUNZIONARI**

18/02/2025

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 3



- 1) La scala di Charriere definisce
 - A il materiale di cui è fatto il catetere vescicale
 - B il calibro del catetere vescicale
 - C il numero delle vie di un catetere vescicale

- 2) In relazione all'emogasanalisi arteriosa quale tra le seguenti affermazioni **NON** è corretta
 - A il sangue può essere prelevato dall'arteria femorale
 - B effettuare antisepsi della sede di inserzione dell'ago per un'area di almeno 10 cm partendo dall'esterno verso l'interno
 - C una delle complicanze è lo stravaso ematico

- 3) Nell'ittero grave da Malattia Emolitica nel neonato, quale valore ematochimico è necessario monitorare
 - A la bilirubina
 - B le transaminasi
 - C la glicemia

- 4) Quale è lo scopo di un drenaggio evaquativo
 - A favorire la risalita dei fluidi biologici
 - B svuotare all'esterno le raccolte liquide
 - C evitare la formazione di raccolte di pus

- 5) Procedura: Posizionamento del sondino naso gastrico. Indicare la corretta sequenza delle azioni
 - posizionare sul torace del paziente una traversa (1)
 - verificare la prescrizione medica sulla documentazione clinica (2)
 - proseguire nell'introduzione dirigendo il sondino posteriormente fino a raggiungere l'orofaringe (3)
 - valutare la lunghezza del sondino da inserire (4)
 - A 4-2-1-3
 - B 1-2-4-3
 - C 2-1-4-3

- 6) Le seguenti sono tutte raccomandazioni per la prevenzione delle ulcere da pressione **TRANNE**
 - A utilizzare presidi in gomma che ampliano la zona di compressione
 - B mantenere una buona idratazione del paziente
 - C ispezionare ogni giorno la cute di tutto il corpo



- 7) Quale fra i seguenti presidi non invasivi per la somministrazione di ossigenoterapia permette di erogare ossigeno a una percentuale definita
- A cannula nasale
 - B sonda nasale
 - C maschera di Venturi
- 8) Quali sono i segni ed i sintomi locali dell'infezione del sito chirurgico
- A dolore irradiato al perimetro della sutura, versamento ematico e trombosi
 - B disidratazione, sudorazione algida e ipotensione
 - C calore, rossore dolore e tumefazione
- 9) La ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico rappresenta un evento che può causare gravi danni all'assistito: il Ministero della Salute raccomanda di
- A effettuare sempre una radiografia intraoperatoria con relativa lettura prima dell'uscita del paziente dalla sala operatoria
 - B effettuare sempre la procedura di conteggio da due operatori contemporaneamente
 - C utilizzare garze radio opache anche per la medicazione della ferita a fine intervento
- 10) In una paziente ricoverata con diagnosi di Gravidanza extrauterina occorre
- A prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelenburg
 - B monitorare i parametri vitali per rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico
 - C mantenere una rigorosa dieta iposodica